



AMOXICILLINA



L'antibiotico amoxicillina è una penicillina classificata come **Access** dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. La classificazione degli antibiotici utilizzata fa riferimento a quella del manuale *AWaRe*, che identifica tre gruppi:

- **Access** - Antibiotici di prima o seconda scelta; offrono il miglior valore terapeutico, minimizzando al contempo il potenziale di resistenza.
- **Watch** - Antibiotici di prima o seconda scelta; indicati solo per un numero specifico e limitato di sindromi infettive; più inclini ad essere bersaglio di resistenza agli antibiotici e quindi prioritariamente oggetto di programmi di *stewardship* e monitoraggi.
- **Reserve** - Ultima risorsa; indicati su pazienti altamente selezionati (infezioni pericolose per la vita dovute a batteri multiresistenti ai farmaci); strettamente monitorati e prioritariamente destinatari di programmi di *stewardship* per garantire la loro continua efficacia.

Il gruppo di lavoro regionale ha raccomandato amoxicillina per via orale in diverse tipologie di infezioni gestite in ambulatorio dai pediatri di libera scelta e dai medici di medicina generale (*vd. tabella*).

	Infezione	Prima scelta
	Faringotonsillite	✓
	Infezioni dentali	✓
	Otite media acuta	✓
	Polmonite comunitaria	✓
	Sinusite	✓
	Riacutizzazione di BPCO	✓
	Infezione	Prima scelta
	Faringotonsillite	✓
	Otite media acuta	✓
	Polmonite comunitaria	✓

Insufficienza Renale ed epatica:

	<ul style="list-style-type: none">• Clearance creatinina ≤ 30 ml/min: adeguare la dose e la frequenza di somministrazione.
	<ul style="list-style-type: none">• Nessuna informazione specifica sull'insufficienza epatica. Considerare la dose abituale. Consigliato il monitoraggio della funzionalità epatica in caso di compromissione epatica grave.



AMOXICILLINA



Somministrazione



- Assumere CON o SENZA cibo. Il cibo può ridurre il disagio gastrointestinale.

Fotosensibilizzazione



- Amoxicillina NON è classificata come agente fotosensibilizzante. Si consiglia comunque di limitare l'esposizione al sole e applicare protezioni solari.

Gravidanza e allattamento



- **Gravidanza:** amoxicillina è considerata sicura.
- **Allattamento:** amoxicillina è compatibile con allattamento che rimane l'opzione più sicura per la madre e il neonato e non va sospeso.

Controindicazioni/avvertenze



- Mononucleosi infettiva.

Principali effetti collaterali



Generalmente ben tollerata. Gli effetti indesiderati più COMUNI sono a livello:

- Gastrointestinale (diarrea e nausea);
- Cutaneo (eruzione cutanea come rash, orticaria).

Per effetti indesiderati meno frequenti si rimanda alla scheda tecnica del prodotto.

Principali interazioni



NON sono note interazioni classificate come potenzialmente gravi o che possano impedire la co-somministrazione con altri farmaci.

(link ad [INTERCheck WEB](#), accesso consentito previa registrazione gratuita)



AMOXICILLINA



Gruppo di lavoro *Antibiotici Territorio* e sottogruppo *Farmacisti* - PrCAR, Emilia-Romagna
ultimo aggiornamento, **settembre 2025**, versione **01**