




Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico in Emilia-Romagna



Interventi ortopedici
dal 01/01/2007 al 31/12/2010



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico in Emilia-Romagna

Questo documento è stato preparato da:

Massimiliano Marchi ASSR Emilia-Romagna
Mita Parenti ASSR Emilia-Romagna

Il format di questo documento è stato originariamente ideato da:

Massimiliano Marchi ASSR Emilia-Romagna
Davide Resi AUSL Ravenna
Cinzia Pozzetti AUSL Ravenna

Per corrispondenza contattare:

ccmsorvica@regione.emilia-romagna.it

Hanno partecipato al sistema di sorveglianza con interventi ortopedici:

AOSPU BOLOGNA*
AOSPU FERRARA
AOSPU MODENA*
AUSL CESENA*
AUSL FORLÌ
AUSL IMOLA*
AUSL MODENA*
AUSL RAVENNA*
AUSL REGGIO EMILIA*
AUSL RIMINI*
CASA DI CURA VILLA MARIA*
HESPERIA HOSPITAL
I.O.R.

* (sorveglianza interventi ortopedici attiva nell'anno 2010)

L'area di programma Rischio Infettivo ringrazia per l'importante contributo tutto il personale che si occupa della sorveglianza negli ospedali partecipanti al sistema; senza di loro e dei loro attenti consigli la redazione di questo documento non sarebbe stata possibile.

Come citare questo documento:

Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna. Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico in Emilia-Romagna. Interventi ortopedici anno 2010. Bologna, Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna, maggio 2012.

maggio 2012

Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna

Indice

Abbreviazioni	6
Summary points	7
Risultati essenziali	8
Introduzione	9
Obiettivi.....	9
Metodi della sorveglianza	9
Misure di incidenza delle infezioni del sito chirurgico e loro stratificazione per rischio.....	11
SSI <i>Ratio</i> o incidenza cumulativa.....	11
SSI <i>Rate</i> o densità di incidenza	11
Risultati	13
Incidenza delle infezioni	13
Momento della diagnosi.....	14
Qualità delle informazioni.....	14
Considerazioni conclusive.....	15
Bibliografia	15

Tempo di lettura stimato: 20 minuti

Abbreviazioni

CDC	Center for Disease Control
IQR	Range Interquartile
IRI	Infection Risk Index
NHSN	National Healthcare Safety Network
SDO	Scheda di Dimissione Ospedaliera
SICHER	Sistema di Sorveglianza Infezioni Sito Chirurgico Emilia-Romagna
SSI	Infezione del sito chirurgico (Surgical Site Infection)
ECDC	European Centre for Disease Prevention and Control

FUSN	Fusione vertebrale
FX	Riduzione aperta di fratture
HPRO	Protesi d'anca
KPRO	Protesi di ginocchio
LAM	Laminectomia
OTH	Altri interventi
RFUSN	Rifusione vertebrale

Surveillance of Surgical Site Infection in Emilia-Romagna, between January 2007 and December 2010

Summary points

- s Data on 9,279 orthopaedic surgeries from 5 categories of surgical procedures have been collected by 20 hospitals in Emilia-Romagna between January 2007 and December 2010.
- s Data collected by SICHER stand for 7% of the overall regional surgical activity.
- s Overall risk of surgical site infection is 1.3%.
- s 77% of SSIs are diagnosed in the post-discharge period.
- s 35% of infections in the major surgical categories affected the deeper tissues (fascial and muscle layers).
- s On the basis of SICHER's data we can estimate that between 1,000 and 1,400 surgical patients every year acquire a SSI in Emilia-Romagna.

Risultati essenziali

- s Il sistema SICHER ha raccolto, in Emilia-Romagna tra gennaio 2007 e dicembre 2010, dati su **9.279 interventi ortopedici** relativi a 5 categorie chirurgiche in 20 ospedali.
- s I dati raccolti da SICHER **rappresentano**, per le categorie sorvegliate, il **7%** dell'attività chirurgica regionale.
- s il **rischio di infezione** globale è pari al **1,3%**.
- s Il **77% delle infezioni** viene diagnosticato durante la sorveglianza **post-dimissione**.
- s Il **35% delle infezioni** coinvolge i **tessuti profondi** interessati dall'intervento.
- s Si può stimare che **ogni anno** nella regione Emilia-Romagna, per le categorie di interventi sorvegliate, si verifichino **da 1.000 a 1.400 infezioni** del sito chirurgico.

Introduzione

Questo documento rappresenta la sintesi dei dati raccolti e riportati dagli ospedali partecipanti al sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (SICHER) coordinato dall'Agenzia Sanitaria e Sociale della regione Emilia-Romagna.

I dati sono stati raccolti, tra gennaio 2007 e dicembre 2010, dagli ospedali che partecipano al sistema.

Tutti gli ospedali partecipanti adottano un metodo standard di generazione e raccolta dei dati¹.

Gli ospedali inviano periodicamente i dati al centro regionale attraverso il trasferimento elettronico degli stessi. Ad ogni invio dei dati segue un ritorno informativo che permette ai reparti di confrontarsi con gli altri della regione e con i dati provenienti dal National Healthcare Safety Network (NHSN).

Obiettivi

Descrivere l'attività chirurgica della Regione Emilia-Romagna per gli interventi principali e stimare la frequenza di "infezioni del sito chirurgico" (Surgical Site Infection, SSI).

Valutare la copertura in ambito regionale del sistema SICHER e la qualità delle informazioni da esso fornite.

Metodi della sorveglianza

SICHER si focalizza su categorie di procedure chirurgiche, ognuna delle quali contiene un definito tipo di interventi simili fra loro. Tali categorie sono quelle proposte dal NHSN degli USA. Se durante una stessa seduta operatoria il paziente viene sottoposto a più interventi, che afferiscono a categorie differenti, si assegna la categoria a maggior rischio di infezione secondo l'algoritmo proposto nel "NHSN Principal Operative Procedure Selection Lists"².

Ogni paziente che viene sottoposto ad una delle procedure prescelte viene incluso nella sorveglianza; per ogni procedura viene raccolto un insieme di dati demografici, come data di nascita e sesso del paziente, con alcuni dettagli sull'intervento chirurgico, come durata dell'operazione, rischio anestesilogico, tecnica dell'intervento, grado di contaminazione del sito chirurgico.

¹ AA.VV. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Sistema Nazionale Sorveglianza Delle Infezioni Del Sito Chirurgico (SNICH) - Protocollo. ASSR Emilia-Romagna, Bologna, aggiornamento dicembre 2011.

² - Division of Healthcare Quality Promotion. The National Healthcare Safety Network (NHSN) Manual, Patient safety component protocol. 1-1-2008. Atlanta,GA,USA, National Center for Infectious Diseases. - NHSN. Surgical Site Infection (SSI) Event. Guidelines and procedures for monitoring SSI. August 2011. <http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/9pscSSIcurrent.pdf>.

I pazienti vengono monitorati durante il decorso post-operatorio al fine di identificare l'eventuale insorgenza di una condizione che soddisfi i criteri di SSI. I criteri per la definizione di infezione del sito chirurgico sono quelli proposti dal CDC nel 1992³; sono infezioni che coinvolgono direttamente i tessuti interessati da una procedura chirurgica (area sopra la fascia muscolare, sotto la fascia muscolare o organi/spazi).

Attualmente vi è l'indicazione di seguire i pazienti per un periodo di 30 giorni dopo l'intervento (per un anno per gli interventi con protesi) e comunque di riportare sempre la data di ultima osservazione del paziente.

Per valutare quanta parte dell'attività chirurgica regionale sia coperta dal sistema SICHER, si è fatto ricorso alla banca dati della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). La SDO è stata istituita, con decreto del Ministero della Sanità 28 dicembre 1991, quale parte integrante della cartella clinica e strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli ospedali pubblici e privati dell'intero territorio nazionale. Le informazioni raccolte descrivono sia aspetti clinici del ricovero (diagnosi e sintomi rilevanti, interventi chirurgici, procedure diagnostico-terapeutiche, impianto di protesi, modalità di dimissione) sia organizzativi (ad esempio: unità operativa di ammissione e di dimissione, trasferimenti interni, soggetto che sostiene i costi del ricovero).

³ Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. *Am J Infect Control* 1999;27:97-132.

Misure di incidenza delle infezioni del sito chirurgico e loro stratificazione per rischio

L'incidenza di infezioni è il numero di nuove infezioni che occorrono in una definita popolazione durante un determinato periodo di tempo, e può essere espressa come *ratio* o *rate*.

SSI *Ratio* o incidenza cumulativa

È il numero di SSIs su 100 interventi appartenenti ad una certa categoria. Esso tiene in considerazione il fatto che ogni paziente può sviluppare più di una infezione per singolo intervento. La *ratio* è la misura più frequente dell'incidenza di SSI ed è più comunemente conosciuta come "Procedure-specific rate". Essa è calcolata nel modo seguente:

N. di SSIs in una specifica categoria	X 100
N. di interventi in quella categoria	

SSI *Rate* o densità di incidenza

È il numero di SSIs su 1000 giorni di sorveglianza post-operatoria dei pazienti sottoposti ad una certa categoria di intervento chirurgico. Tiene in considerazione la popolazione a rischio e la durata della sorveglianza (numero di giorni dalla data dell'intervento alla data dell'ultimo contatto con il paziente).

N. di SSIs in una specifica categoria	X 1000
N. di giorni-paziente nel post-operatorio per quella categoria	

Le diverse categorie di intervento comportano un rischio di infezione differente e il confronto fra unità operative che hanno attività completamente differenti per categoria di intervento non sarebbe equo (ad esempio non si possono confrontare chirurgie generali a vocazione addominale con chirurgie generali a vocazione senologica, avendo le prime un rischio di base notevolmente superiore alle seconde).

Inoltre, nell'ambito di ogni categoria di intervento è importante tener presente le caratteristiche del paziente e il rischio di base della singola procedura chirurgica; unità operative che operano pazienti molto gravi ed eseguono operazioni molto complesse hanno un rischio di base più elevato rispetto ad unità operative con attività rivolta a pazienti meno gravi. Esiste un indice che permette di tener conto di queste differenze nel rischio individuale di infezione, tale indice si chiama Infection Risk Index (IRI). Esso si calcola sulla base dei seguenti fattori di rischio: grado di contaminazione dei tessuti interessati dall'intervento, durata e tecnica dell'intervento, condizioni generali del paziente, e assume valori di rischio

crescente da M a 0, 1, 2 e 3⁴. Ad esempio un paziente con intervento sul colon e con IRI uguale a 3 è a maggior rischio di aver un'infezione rispetto ad un paziente con lo stesso intervento sul colon ma con IRI uguale a M.

Al fine di confrontare in modo equo l'incidenza delle infezioni nelle differenti realtà *ratio* e *rate* vengono calcolati nell'ambito di ciascuna categoria di intervento per ciascun valore di IRI.

⁴ Haley RW, Hooton TM, Culver DH, Stanley RC, Emori TG, Hardison CD et al. Nosocomial infections in U.S. hospitals, 1975-1976: estimated frequency by selected characteristics of patients. Am.J Med. 1981;70:947-59.

Risultati

In Emilia-Romagna tra gennaio 2007 e dicembre 2010, sono stati raccolti, da 20 ospedali, dati su 9.279 interventi ortopedici relativi a 5 categorie chirurgiche.

Nel 2010, la copertura di SICHChER, per le categorie interessate, rispetto all'attività chirurgica regionale è pari al 7% (tabella 1).

Tabella 1. Copertura del sistema SICHChER.
Dati SDO e dati SICHChER anno 2010: interventi nei presidi ospedalieri per categoria*.

Categoria	Regione Emilia Romagna (SDO)			Regione Emilia Romagna (SICHChER)			
	Ospedali	Interventi	Interventi in strutture pubbliche (a)	Ospedali	Interventi	Interventi in strutture pubbliche (b)	Copertura (b)/(a)
FUSN	12	1.957	1.434	1	110	110	8%
FX	24	9.709	9.709	5	180	180	2%
HPRO	42	10.344	8.249	12	922	919	11%
KPRO	45	6.978	2.670	12	251	232	9%
LAM	26	4.763	2.565	3	216	216	8%
Totale		33.751	24.627		1.679	1.657	7%

* attività degli ospedali che eseguono abitualmente - almeno uno alla settimana - tali interventi (questi ospedali effettuano il 99% dell'attività chirurgica regionale).

Incidenza delle infezioni

Nel periodo tra gennaio 2007 e dicembre 2010, sono state riportate 118 infezioni del sito chirurgico. Il 35% delle infezioni coinvolge i tessuti profondi o gli organi/spazi interessati dall'intervento.

Il rischio complessivo di infezione del sito chirurgico è pari al 1,3%. Il rischio di infezione varia nelle diverse categorie e in funzione della presenza di fattori di rischio: la tabella 2, riporta l'incidenza delle infezioni del sito chirurgico per le categorie di intervento sorvegliate, stratificata per *infection risk index*.

Tabella 2. Incidenza delle infezioni del sito chirurgico
Interventi in regione dal 01/01/2007 al 31/12/2010: Interventi, giorni di sorveglianza e incidenza di infezioni per categoria e per IRI

Categoria	IRI	Infezioni	Interventi	Giorni di Sorveglianza	Ratio	Rate
		(a)	(b)	(c)	(a/b*100)	(a/c*1000)
FUSN	0;1	93	0	3.086	0,0	0,0
	N.D.	94	0	774	0,0	0,0
	Totale	187	0	3.860	0,0	0,0
FX	0;1	664	8	21.766	1,2	0,4
	2;3	20	0	490	0,0	0,0

Categoria	IRI	Infezioni (a)	Interventi (b)	Giorni di Sorveglianza (c)	Ratio (a/b*100)	Rate (a/c*1000)
FX	N.D.	220	0	2.113	0,0	0,0
	Totale	904	8	24.369	0,9	0,3
HPRO	0;1	3.966	75	914.773	1,9	0,1
	2;3	131	5	11.760	3,8	0,4
	N.D.	683	4	42.672	0,6	0,1
	Totale	4.780	84	969.205	1,8	0,1
KPRO	0;1	1.196	16	198.456	1,3	0,1
	2;3	52	0	6.981	0,0	0,0
	N.D.	303	3	17.847	1,0	0,2
	Totale	1.551	19	223.284	1,2	0,1
LAM	0;1	74	2	1.159	2,7	1,7
	2;3	1	0	34	0,0	0,0
	N.D.	550	0	4.380	0,0	0,0
	Totale	625	2	5.573	0,3	0,4
OTH	N.D.	1.232	5	14.932	0,4	0,3
	Totale	1.232	5	14.932	0,4	0,3

Note:

La classe di rischio "M" è stata aggregata alla classe "0".

N.D. = IRI non calcolabile

Momento della diagnosi

La mediana del tempo intercorso tra l'intervento e la diagnosi di infezione è di 34 giorni (IQR 20- 118 giorni). Il 77% delle infezioni viene diagnosticato dopo la dimissione.

Tabella 3. Momento della diagnosi
Degenza post-operatoria, tempistica e momento della diagnosi per categoria

Categoria	Degenza Post-Intervento (Giorni)	Diagnosi (Giorni dall'intervento)	Diagnosi Post- Dimissione
	Mediana (IQR)	Mediana (IQR)	(%)
FUSN	8 (8-8)	--	--
FX	11 (7-18)	22 (13-30)	57%
HPRO	10 (8-16)	42 (20-116)	77%
KPRO	8 (7-15)	30 (25-146)	100%
LAM	8 (7-8)	19 (13-25)	50%
OTH	2 (2-7)	274 (182-331)	100%
Totale	8 (7-14)	34 (20-118)	77%

Qualità delle informazioni

I dati inviati al centro regionale mostrano una buona qualità generale sia in termini di coerenza che in termini di completezza delle informazioni.

Tuttavia nel 23% dei record non è stato possibile calcolare l'IRI (IRI = N.D.); tutte le infezioni sono state classificate in base al tipo (superficiali, profonde e di organi/spazi).

Considerazioni conclusive

Sulla base dei dati rilevati da SICHER si può stimare un numero di infezioni annue pari a 1.000-1.400 per gli interventi ortopedici in sorveglianza. Questo dato conferma la rilevanza delle infezioni del sito chirurgico nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria.

Per una proporzione significativa (quasi un quarto) di interventi non è possibile calcolare l'IRI. Per essi la possibilità di confronto risulta più limitata. Tuttavia, la qualità di questo dato è in miglioramento: nell'ultimo anno, infatti, la proporzione di informazioni mancanti è scesa attorno al 15%.

La copertura di SICHER sul totale delle attività chirurgiche (interventi ortopedici) della regione è del 7%.

Al fine di meglio misurare la frequenza delle SSI viene ribadita l'importanza della sorveglianza post-dimissione (il 77% delle infezioni viene diagnosticato dopo la dimissione).


Il sistema SICHER è ormai in funzione da circa cinque anni e la qualità della rilevazione è progressivamente cresciuta. La banca dati regionale si è arricchita nel tempo, grazie anche all'adesione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private, consentendo, d'ora in avanti, la possibilità di approfondimenti e la valutazione di tendenze temporali sul fenomeno delle infezioni del sito chirurgico.

Bibliografia

1. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. *Am J Infect Control* 1999;27:97-132.
2. Division of Healthcare Quality Promotion. The National Healthcare Safety Network (NHSN) Manual, Patient safety component protocol. 1-1-2008. Atlanta,GA,USA, National Center for Infectious Diseases.
3. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Sistema Nazionale Sorveglianza Delle Infezioni Del Sito Chirurgico (SNICH) - Protocollo. ASSR Emilia-Romagna, Bologna, aggiornamento dicembre 2011.
4. Haley RW, Hooton TM, Culver DH, Stanley RC, Emori TG, Hardison CD et al. Nosocomial infections in U.S. hospitals, 1975-1976: estimated frequency by selected characteristics of patients. *Am.J Med.* 1981;70:947-59.
5. NHSN. Surgical Site Infection (SSI) Event. Guidelines and procedures for monitoring SSI. August 2011.
<http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/9pscSSIcurrent.pdf>.

Agenzia Sanitaria e Sociale
Regione Emilia-Romagna
Sorveglianza infezioni del sito chirurgico
Area Rischio Infettivo
Viale Aldo Moro 21
40137
Bologna, Italia

<http://asr.regione.emilia-romagna.it>



maggio 2012
Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna